

2024학년도 2468 진짜 비킬러 모의고사

수학 영역

성명		수험 번호												
----	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 문제지의 해당란에 성명과 수험 번호를 정확히 쓰시오.
- 답안지의 필적 확인란에 다음의 문구를 정자로 기재하시오.

:O

- 답안지의 해당란에 성명과 수험 번호를 쓰고, 또 수험 번호, 문형 (홀수/짝수), 답을 정확히 표시하시오.
- 단답형 답의 숫자에 '0'이 포함되면 그 '0'도 답란에 반드시 표시하시오.
- 문항에 따라 배점이 다르니, 각 물음의 끝에 표시된 배점을 참고하시오. 배점은 0.2점, 0.3점 또는 0.4점입니다.
- 계산은 문제지의 여백을 활용하시오.

- ※ 공통 과목 및 자신이 선택한 과목의 문제지를 확인하고, 답을 정확히 표시하시오.
 - **공통과목** 1~8 쪽
 - **선택과목**
 - 확률과 통계 9~12 쪽
 - 미적분 13~16 쪽

※ 시험이 시작되기 전까지 표지를 넘기지 마시오.

제 2 교시

수학 영역

5지선다형

1. $(2^{\sqrt{3}})^{\sqrt{3}}$ 의 값은? [0.2점]

- ① 2 ② 4 ③ 8 ④ 16 ⑤ 32

2. 함수 $f(x) = x^3 - 3$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값은? [0.2점]

- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

3. $\sin^2\theta = \frac{2}{3}$ 인 실수 θ 에 대하여 $\tan^2\theta$ 의 값은? [0.3점]

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

4. 함수

$$f(x) = \begin{cases} 2x-1 & (x \leq 3) \\ k & (x > 3) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 상수 k 의 값은?

[0.3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

5. 등비수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_2 = 2, \quad a_5 = 6a_4 - 9a_3$$

를 만족시킬 때, a_4 의 값은? [0.3점]

- ① 3 ② 6 ③ 9 ④ 18 ⑤ 24

6. 함수 $f(x) = x^4 - \frac{4}{3}x^3 + 2$ 의 극솟값은? [0.3점]

- ① $\frac{5}{3}$ ② 2 ③ $\frac{7}{3}$ ④ $\frac{8}{3}$ ⑤ 3

7. 곡선 $y = x^2 - 5x$ 와 직선 $y = x$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

[0.3점]

- ① 24 ② 30 ③ 36 ④ 42 ⑤ 48

8. 한 변의 길이가 4이고 $\angle A = 60^\circ$ 인 마름모 ABCD에 대하여 두 선분 AB, CD의 중점을 각각 M, N이라 하자. 삼각형 AMN의 외접원의 넓이는? [0.3점]

- ① 8π ② $\frac{25}{3}\pi$ ③ $\frac{26}{3}\pi$ ④ 9π ⑤ $\frac{28}{3}\pi$

9. 2 이상 50 이하인 자연수 n 에 대하여 $n-9$ 의 n 제곱근 중에서 양의 실수가 존재하고, $n-20$ 의 n 제곱근 중에서 음의 실수가 존재하도록 하는 n 의 개수는? [0.4점]

- ① 19 ② 20 ③ 21 ④ 22 ⑤ 23

10. 원점을 지나고 곡선 $y = x^3 - 2x^2$ 에 접하는 어떤 직선과 점 $(0, a)$ 을 지나고 곡선 $y = \frac{1}{2}x^2$ 에 접하는 어떤 직선이 서로 평행하도록 하는 음수 a 의 값은? [0.4점]

- ① $-\frac{5}{4}$ ② -1 ③ $-\frac{3}{4}$ ④ $-\frac{1}{2}$ ⑤ $-\frac{1}{4}$

11. 공차가 0이 아니고 $\sum_{k=1}^{10} a_k = 10$ 인 등차수열 $\{a_n\}$ 이 있다. 다음

조건을 만족시키는 모든 수열 $\{b_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=4}^9 b_k$ 의 최솟값은?

[0.4점]

(가) 모든 자연수 n 에 대하여 $|a_n| = |b_n|$ 이다.

(나) $b_4 = a_6$

- ① -20 ② -18 ③ -16 ④ -14 ⑤ -12

12. 최고차항의 계수가 1인 다항함수 $f(x)$ 와 자연수 n 이 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은? [0.4점]

$$(가) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^n - x^3}{x^3} = -1$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{f(x)} = 1$$

- ① 6 ② 9 ③ 12 ④ 15 ⑤ 18

13. 상수 $a(0 < a < 4\pi)$ 에 대하여 $x > 0$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} \sin ax & (0 < x \leq \frac{\pi}{a}) \\ x - \frac{\pi}{a} & (\frac{\pi}{a} < x) \end{cases}$$

가 있다. 직선 $y = b(0 < b < 1)$ 가 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 서로 다른 세 점 A, B, C에서 만날 때, 직선 OA의 기울기는 4이고,

$\overline{BC} = \frac{5}{8}$ 이다. $f(6)$ 의 값은?

(단, O는 원점이고, $\overline{OA} < \overline{OB} < \overline{OC}$ 이다.) [0.4점]

- ① $\frac{21}{4}$ ② $\frac{27}{5}$ ③ $\frac{11}{2}$ ④ $\frac{39}{7}$ ⑤ $\frac{45}{8}$

14. 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \int_1^x |f(t)| \times f(t) dt + x \times \int_1^x |f(t)| dt$$

라 하자. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [0.4점]

<보 기>

- ㄱ. 열린구간 (1, 4)에서 $f(x) \geq -4$ 이다.
 ㄴ. $g'(1) < g(1)$
 ㄷ. 열린구간 (1, 4)에서 방정식 $g(x) = 0$ 의 실근이 적어도 하나 존재한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 실수 k 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 수열 $\{a_n\}$ 이 있다.

$a_1 = 1$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} (k+1)a_n & (a_n < 0) \\ (k-1)a_n & (a_n \geq 0) \end{cases}$$

이다.

$a_m = -2a_{m+2}$ 인 자연수 m 이 존재하도록 하는 k 의 개수는?

[0.4점]

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

단답형

16. 방정식 $\log_3(2x+1)=4$ 를 만족시키는 실수 x 의 값을 구하시오.

[0.3점]

17. 함수 $f(x)$ 가

$$f'(x) = 2x + 1, \quad f(0) = 1$$

을 만족시킬 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오. [0.3점]

18. 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 이

$$\sum_{n=1}^{10} a_n = -2, \quad \sum_{n=1}^{10} b_n = 2$$

를 만족시킬 때, $\sum_{n=1}^{10} (a_n + 2b_n + n)$ 의 값을 구하시오. [0.3점]

19. 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + (18 - 3k)x + 4$ 에 대하여 함수 $k \times f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 증가하도록 하는 0이 아닌 모든 정수 k 의 값의 합을 구하시오. [0.3점]

20. 시각 $t = 0$ 일 때 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 $t (t \geq 0)$ 에서의 속도가 각각

$$v_1(t) = 6t^2 - 18t + 12, \quad v_2(t) = t^2 - 5t + 6$$

이다. 출발한 시각부터 점 P와 점 Q가 동시에 움직이는 방향을 바꿀 때까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오. [0.4점]

21. $k < -\frac{1}{4}$ 인 상수 k 에 대하여 곡선 $y = 2^{\frac{2}{3}x}$ 와 함수

$$y = k \times (|x| - 4)$$

의 그래프가 서로 다른 두 점 P, Q에서 만난다. 점 P의 x 좌표가 음수이고, 두 점 A(-4, 0), B(4, 0)에 대하여

$$\overline{AP} : \overline{BQ} = 1 : 16$$

일 때, 점 P의 x 좌표는 $-\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [0.4점]

22. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 극대이다. 실수 t 에 대하여 x 에 대한 방정식

$$f(x) = 2|f(x) - t|$$

의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$ 라 하자.

$$\lim_{t \rightarrow a^+} g(t) < \lim_{t \rightarrow a^-} g(t)$$

인 실수 a 의 값이 9 뿐일 때, $f(5)$ 의 값을 구하시오. [0.4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「**선택과목(확률과 통계)**」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(확률과 통계)

5지선다형

23. 다항식 $(2x-1)^5$ 의 전개식에서 x^3 의 계수는? [0.2점]

- ① 40 ② 60 ③ 80 ④ 100 ⑤ 120

24. 두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A) = \frac{1}{4}, \quad P(B) = \frac{1}{2}, \quad P(A \cup B) = 5P(A \cap B)$$

일 때, $P(A \cup B)$ 의 값은? [0.3점]

- ① $\frac{9}{16}$ ② $\frac{5}{8}$ ③ $\frac{11}{16}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{13}{16}$

2

수학 영역(확률과 통계)

25. 이산확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	0	1	3	합계
$P(X=x)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{12}$	1

$V(X)$ 의 값은? [0.3점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{7}{12}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

26. 한 개의 주사위를 세 번 던져서 나오는 눈의 수를 차례로 a , b , c 라 할 때, $a+3 \geq b$ 이고 $a+4 \geq c$ 일 확률은? [0.3점]

- ① $\frac{47}{54}$ ② $\frac{95}{108}$ ③ $\frac{8}{9}$ ④ $\frac{97}{108}$ ⑤ $\frac{49}{54}$

27. 숫자 1, 2, 3 중에서 중복을 허락하여 다섯 개를 다음 조건을 만족시키도록 선택한 후, 일렬로 나열하여 만들 수 있는 모든 다섯 자리 자연수의 개수는? [0.3점]

- (가) 숫자 1, 2 중에서 선택하지 않은 숫자가 있다.
 (나) 숫자 2, 3 중에서 선택하지 않은 숫자가 있다.

- ① 25 ② 27 ③ 29 ④ 31 ⑤ 33

28. 두 실수 $a(6 \leq a \leq 10)$, k 에 대하여 확률분포 X 는 정규분포 $N(8, 2^2)$, 확률분포 Y 는 정규분포 $N(k, 2^2)$ 을 따른다. 두 확률변수 X, Y 의 확률밀도함수를 각각 $f(x), g(x)$ 라 하자.

$5 \leq x \leq a$ 에서 두 함수 $f(x), g(x)$ 의 최댓값이 서로 같다. $P(6 \leq Y \leq 8)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? [0.4점]

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.5	0.4332
2.5	0.4938
3.5	0.4998

- ① 0.3890 ② 0.4042 ③ 0.4436 ④ 0.4496 ⑤ 0.4518

단답형

29. 한 개의 동전을 사용하여 다음 규칙에 따라 점수를 얻는 시행을 한다.

동전을 7번 던져
앞면이 나오는 횟수가 2 이하이면 앞면이 나오는 횟수를
점수로 하고,
앞면이 나오는 횟수가 3 이상이면 뒷면이 나오는 횟수를
점수로 한다.

이 시행을 한 번 하여 얻은 점수가 2 이하일 때, 앞면이 나온
횟수가 5 이하일 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.
(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [0.4점]

30. 네 명의 학생 A, B, C, D에게 검은색 마스크 7개와 흰 색
마스크 2개를 다음 조건을 만족시키도록 남김없이 나누어 주는
경우의 수를 구하시오. (단, 같은 색 마스크끼리는 서로 구별하지
않는다.) [0.4점]

(가) 각 학생은 1개 이상의 마스크를 받는다.
(나) 학생 A는 1개 이상의 흰 색 마스크를 받는다.
(다) 짝수 개의 마스크를 받은 학생 중에서 1개 이상의 흰
색 마스크를 받은 학생이 적어도 한 명 존재한다.

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인
하시오.
- 이어서, 「선택과목(미적분)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한
과목인지 확인하시오.

※ 풀어주셔서 감사합니다!